

6.泌尿器

6-1 腎癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
Nivolumab	ニボルマブ	240mg	d1	14日間	最小度	
Nivolumab 4週ごと	ニボルマブ	480mg	d1	28日間	最小度	
Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ イピリムマブ	Nivo:240mg Ipilimumab: 1mg/kg	d1 d1	21日間	最小度	4コース
Temsirolimus	テムシロリムス	25mg	d1	7日間	最小度	
ペムブロリズマブ+アキシチニブ	ペムブロリズマブ アキシチニブ	ペムブロリズマブ: 200mg アキシチニブ: 10mg po	d1 d1-21	21日間	-	

6-2 前立腺癌

6-2-1 ホルモン療法

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
22.5mg/リユープリンプロレリン酢酸塩	リユーフロリン	22.5mg	d1	24週	-	

6-2-1 化学療法

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CBZ	カバジタキセル	20mg/m ²	d1	21日間	軽度	
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	d1	21日間	軽度	

6-3 尿路上皮癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
GC	ゲムシタビン	GEM: 1000mg/m ²	d1.8	21日間	d1.8: 軽度 d2: 高度	イメンド併用
GC sh.ver	シスプラチン	CDDP: 70mg/m ²	d2			
GCarbo 入院	ゲムシタビン	GEM: 1000mg/m ²	d1.8	21日間	d1: 中等度 d8: 軽度	イメンド併用
GCarbo 外来	カルボプラチン	CBDCA: AUC5	d1			
M-VAC	メトレキサート ビンブラスチン ドキシルビシン シスプラチン	MTX: 30mg/m ² VLB: 3mg/m ² ADM: 30mg/m ² CDDP: 70mg/m ²	d1.15.22 d2.15.22 d2 d2	28日間	高度	イメンド併用
アベルマブ維持療法	アベルマブ	10mg/kg	d1	14日間	-	
エンホルツマブ ベドチン	エンホルツマブ ベドチン	1.25mg/kg	d1.8.15	28日間		
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg	d1	21日間	最小度	
ペムブロリズマブ 6週ごと	ペムブロリズマブ	400mg	d1	42日間	最小度	

6-4 精巣癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
BEP	ブレオマイシン イトホシド シスプラチン	BLM: 30mg VP-16: 100mg/m ² CDDP: 20mg/m ²	d1.8.15 d1-5 d1-5	21日間	高度	イメンド併用
EP	イトホシド シスプラチン	VP-16: 100mg/m ² CDDP: 20mg/m ²	d1-5 d1-5	21日間	高度	イメンド併用
VIP	イトホシド イホスファミド シスプラチン	VP-16: 75mg/m ² IFM: 1200mg/m ² CDDP: 20mg/m ²	d1-5 d1-5 d1-5	21日間	高度	イメンド併用

6-5 その他

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
TIP	パクリタキセル イホスファミド シスプラチン	PTX: 175mg/m ² IFM: 1200mg/m ² CDDP: 25mg/m ²	d1 d1-3 d1-3	3-4週	高度	陰茎癌