

7.頭頸部癌

| レジメン名 | 一般名 | 投与量 | 投与日 | 1クール | 催吐リスク分類 | 備考 |
|---|---------------------------------|---|-------------------------|------|---------|---|
| Cmab 1回目 Cmab 2回目以降 | セツキシマブ | C-mab: (初回) 400mg/m ² (2回目以降) 250mg/m ² | d1 | 7日間 | 最小度 | |
| Cmab+FP CBDCA 1コース目 Cmab+FP CBDCA 2-6コース目 | セツキシマブ カルボプラチン フルオロウラシル | C-mab: (初回) 400mg/m ² (2回目以降) 250mg/m ² CBDCA: AUC5 5-FU: 1000mg/m ² | d1.8.15 d1 d1-4 | 21日間 | 中等度 | イメンド併用 |
| Cmab+FP CDDP 1コース目 Cmab+FP CDDP 2-6コース目 | セツキシマブ シスプラチン フルオロウラシル | C-mab: (初回) 400mg/m ² (2回目以降) 250mg/m ² CDDP: 100mg/m ² 5-FU: 1000mg/m ² | d1.8.15 d1 d1-4 | 21日間 | 高度 | FP最大6コース イメンド併用 |
| FP | シスプラチン フルオロウラシル | CDDP: 100mg/m ² 5-FU: 1000mg/m ² | d1 d1-4 | 21日間 | 高度 | イメンド併用 |
| PCE 1コース目 PCE 2-6コース目 PCE 維持療法 (Cmab単剤) | セツキシマブ パクリタキセル カルボプラチン | C-mab: (初回) 400mg/m ² (2回目以降) 250mg/m ² PTX: 100mg/m ² CBDCA: AUC2.5 | d1.8.15 d1.8 d1.8 | 21日間 | 中等度 | 6コース目終了後 Cmab単剤で維持療法 |
| PTX+Cmab 1回目 PTX+Cmab 2回目以降 | セツキシマブ パクリタキセル | C-mab: (初回) 400mg/m ² (2回目以降) 250mg/m ² PTX: 80mg/m ² | d1 | 7日間 | 軽度 | |
| PTX | パクリタキセル | 80mg/m ² | d1 | 7日間 | 軽度 | |
| ニボルマブ | ニボルマブ | 240mg | d1 | 14日間 | 最小度 | |
| ニボルマブ 4週間隔 | ニボルマブ | 480mg | d1 | 28日間 | 最小度 | |
| ベムプロリスマブ | ベムプロリスマブ | 200mg | d1 | 21日間 | 最小度 | |
| ベムプロリスマブ 6週間隔 | ベムプロリスマブ | 400mg | d1 | 42日間 | 最小度 | |
| ベムプロリスマブ+CBDCA+5FU | ベムプロリスマブ カルボプラチン フルオロウラシル | ベムプロリスマブ: 200mg CBDCA: AUC5 5-FU: 1000mg/m ² | d1 d1 d1-4 | 21日間 | 中等度 | 最大6コース 終了後はベムプロリスマブ単剤へ イメンド併用 |
| ベムプロリスマブ+CDDP+5FU | ベムプロリスマブ シスプラチン フルオロウラシル | ベムプロリスマブ: 200mg CDDP: 100mg/m ² 5-FU: 1000mg/m ² | d1 d1 d1-4 | 21日間 | 高度 | 最大6コース 終了後はベムプロリスマブ単剤へ イメンド併用 |
| 放射線併用CBDCA | カルボプラチン | AUC5-7 | d1 | 21日間 | 中等度 | 放射線併用、 3コース |
| 放射線併用CDDP 放射線併用CDDP sh.ver | シスプラチン | 100mg/m ² | d1 | 21日間 | 高度 | 放射線併用 3コース イメンド併用 *sh.verでは80mg/m ² 以下が適応 (80mg/m ² 以上では安全性が 検討されていないため) |
| 放射線併用Cmab 1回目 放射線併用Cmab 2回目以降 | セツキシマブ | (初回) 400mg/m ² (2回目以降) 250mg/m ² | d1 | 7日間 | 最小度 | 放射線併用 8コース |
| 放射線併用NDP | ネダプラチン | 100mg/m ² | d1 | 21日間 | 中等度 | 放射線併用 |