

4.血液

4-5 マクログロブリン血症

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
BDR① BDR②-④ BDR③-④(R90min)	ホルテゾミア デキサメタゾン リツキシマブ	Bor: 1.3mg/m ² Dex: 40mg/body R: 375mg/m ²	d1.4.8.11 d1.4.8.11 d11	21日間	軽度	
BDR⑤-⑧ BDR⑤-⑧(R90min)	ホルテゾミア デキサメタゾン リツキシマブ	Bor: 1.3mg/m ² Dex: 40mg/body R: 375mg/m ²	d1.4.8.11 d1.4.8.11 d11	3ヶ月	軽度	
BS★DRC(初回)	デキサメタゾン	DEX: 20mg	d1	21日間		
BS★DRC(2回目以降)	リツキシマブ	R: 375mg/m ²	d1			
BS★DRC(2回目以降)(R90min)	シクロホスファミド	CPA: 200mg/m ² 2X po	d1-5			

4-6 骨髄異形成症候群

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
AZA	アザチジン	AZA:75mg/m ²	d1-5	28日間	中等度	最大7日間投与

4-7 血球貪食症候群

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
HLH2004(VP16)	エトホシド	ETP:150mg/m ²	d1	-	-	1-2週目は週2回 3-8週目は週1回 9週以降2週毎に投与

4-8 その他

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
全身性AL7ミロト-シス DCyBorD療法①~②	ダラツムマブ シクロホスファミド ホルテゾミア デキサメタゾン	Dara:1800mg CPA: 300mg/m ² po BOR: 1.3mg/m ² DEX:40mg po	d1.8.15.22 d1.8.15.22 d1.8.15.22 d1.8.15.22	28日間	軽度	
全身性AL7ミロト-シス DCyBorD療法③~⑥	ダラツムマブ シクロホスファミド ホルテゾミア デキサメタゾン	Dara:1800mg CPA: 300mg/m ² po BOR: 1.3mg/m ² DEX:40mg po	d1.15 d1.8.15.22 d1.8.15.22 d1.8.15.22	28日間	軽度	
全身性AL7ミロト-シス DCyBorD療法⑦~	ダラツムマブ デキサメタゾン	Dara:1800mg DEX:20mg po	d1 d1	28日間	軽度	