

6.泌尿器

6-1 腎癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
Nivolumab	ニボルマブ	240mg	d1	14日間	最小度	
Nivolumab 4週ごと	ニボルマブ	480mg	d1	28日間	最小度	
Nivolumab+Ipilimumab	ニボルマブ イピリムマブ	Nivo:240mg Ipilimumab:1mg/kg	d1 d1	21日間	最小度	4コース
Temsirolimus	テムシロリムス	25mg	d1	7日間	最小度	
ペムブロリズマブ+アキシチニブ	ペムブロリズマブ アキシチニブ	ペムブロリズマブ:200mg アキシチニブ:10mg po	d1 d1-21	21日間	-	
ペムブロリズマブ+アキシチニブ 6週ごと	ペムブロリズマブ アキシチニブ	ペムブロリズマブ:400mg アキシチニブ:10mg po	d1 d1-42	42日間	-	
ペムブロリズマブ+レンパチニブ	ペムブロリズマブ レンパチニブ	ペムブロリズマブ:200mg レンパチニブ:20mg po	d1 d1-21	21日間	-	
ペムブロリズマブ+レンパチニブ 6週ごと	ペムブロリズマブ レンパチニブ	ペムブロリズマブ:400mg レンパチニブ:20mg po	d1 d1-42	42日間	-	

6-2 前立腺癌

6-2-1 ホルモン療法

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
22.5mgリュープリングプロレリン酢酸塩	リュープロリン	22.5mg	d1	24週	-	

6-2-1 化学療法

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CBZ	カバジタキセル	20mg/m ²	d1	21日間	軽度	
DTX	ドセタキセル	70mg/m ²	d1	21日間	軽度	
DTX+darolutamide	ドセタキセル ダルルタミド	DTX:70mg/m ² ニューケオ:1200mg/日 po	d1 d1-21	21日間	軽度	
EP(適応外使用)	エトホシド シスプラチン	VP-16:100mg/m ² CDDP:20mg/m ²	d1-5 d1-5	21日間	高度	

6-3 尿路上皮癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
GC GC sh.ver	ゲムシタビン シスプラチン	GEM:1000mg/m ² CDDP:70mg/m ²	d1.8 d2	21日間	d1.8:軽度 d2:高度	
GCarbo 入院 GCarbo 外来	ゲムシタビン カルボプラチン	GEM:1000mg/m ² CBDCA:AUC5	d1.8 d1	21日間	d1:中等度 d8:軽度	
M-VAC	メトレキサート ビンブラスチン ドキシルビシン シスプラチン	MTX:30mg/m ² VLB:3mg/m ² ADM:30mg/m ² CDDP:70mg/m ²	d1.15.22 d2.15.22 d2 d2	28日間	高度	
アベルマブ維持療法	アベルマブ	10mg/kg	d1	14日間	-	
エンホルツマブ ベドチン	エンホルツマブ [®] ベドチン	1.25mg/kg	d1.8.15	28日間		
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg	d1	21日間	最小度	
ペムブロリズマブ 6週ごと	ペムブロリズマブ	400mg	d1	42日間	最小度	
ニボルマブ 2週間隔	ニボルマブ	240mg	d1	14日間	-	
ニボルマブ 4週間隔	ニボルマブ	480mg	d1	28日間	-	

6-4 精巣癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
BEP	ブレオマイシン エトホシド シスプラチン	BLM:30mg VP-16:100mg/m ² CDDP:20mg/m ²	d1.8.15 d1-5 d1-5	21日間	高度	
EP	エトホシド シスプラチン	VP-16:100mg/m ² CDDP:20mg/m ²	d1-5 d1-5	21日間	高度	
VIP	エトホシド イホスファミド シスプラチン	VP-16:75mg/m ² IFM:1200mg/m ² CDDP:20mg/m ²	d1-5 d1-5 d1-5	21日間	高度	
TIP	パクリタキセル イホスファミド シスプラチン	PTX:210mg/m ² IFM:1200mg/m ² CDDP:20mg/m ²	d1 d2-6 d2-6	21日間	高度	

6-5 その他

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
IE	エトホシド イホスファミド	VP-16:100mg/m ² IFM:1800mg/m ²	d1-5 d1-5	3-6週	中等度	VDCと交互に使用 【適応】PNET (原始神経外胚葉性腫瘍) (骨軟部腫瘍)
VAC		コスマゲン:1.25mg/m ² VCR:1.5mg/m ² CPA:1200mg/m ²	d1 d1 d1	21日間		
VDC	ドキシルビシン ビンクリスチン シクロホスファミド	DXR:75mg/m ² VCR:1.5mg/m ² CPA:1200mg/m ²	d1 d1 d1	3-6週	高度	IEと交互で使用
THP	ビラルビシン	THP:40mg	d1	-	-	
TIP	パクリタキセル イホスファミド シスプラチン	PTX:175mg/m ² IFM:1200mg/m ² CDDP:25mg/m ²	d1 d1-3 d1-3	3-4週	高度	陰茎癌