

9.その他

8-1 MSI-High固形癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
ペムプロリスマブ	ペムプロリスマブ	200mg	d1	21日間	最小度	

8-2 原発不明癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CBDCA+PTX	カルボプラチン パクリタキセル	CBDCA: AUC6 PTX: 200mg/m ²	d1	21日間	高度	

8-3 神経内分泌腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CBDCA+VP16	カルボプラチン エトホシト	CBDCA: AUC5 VP-16: 80mg/m ²	d1 d1-3	21日間	高度	
CDDP+CPT-11 CDDP+CPT-11 sh.vr	シスプラチン イリリテカン	CDDP: 60mg/m ² CPT-11: 60mg/m ²	d1 d1.8.15	28日間	d1: 高度 d8.15: 軽度	
CDDP+VP16 CDDP+VP16 sh.vr	シスプラチン エトホシト	CDDP: 80mg/m ² VP-16: 100mg/m ²	d1 d1-3	21日間	高度	

8-4 悪性軟部腫瘍

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
エリブリン	エリブリン	1.4mg/m ²	d1.8	21日間	軽度	
トラベクテジン	トラベクテジン	1.2mg/m ²	d1	21日間		

8-5 褐色細胞腫

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CVD	シクロホスファミド ビンクリスチン ダカルバジン	CPA: 750mg/m ² VCR: 1.4mg/m ² DTIC: 600mg/m ²	d1 d1 d1.2	21日間	高度	