

7.頭頸部癌

レジメン名	一般名	投与量	投与日	1クール	催吐リスク分類	備考
CDDP同時併用CRT	シスプラチン	CDDP: 100mg/m ² RT:	day2	21日間	高度	3コース イメンド併用
Cmab 1回目 Cmab 2回目以降	セツキシマブ	C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ²	day1	7日間	最小度	
Cmab RT 1回目 Cmab RT 2回目以降	セツキシマブ	C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² RT:	day1 RT:	7日間	最小度	8コース
Cmab+FP CBDCA 1コース目 Cmab+FP CBDCA 2-6コース目	セツキシマブ カルボプラチン フルオロウラシル	C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² CBDCA: AUC5 5-FU: 1000mg/m ²	day1.8.15 day1 day1-4	21日間	中等度	イメンド併用
Cmab+FP CDDP 1コース目 Cmab+FP CDDP 2-6コース目	セツキシマブ シスプラチン フルオロウラシル	C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² CDDP: 100mg/m ² 5-FU: 1000mg/m ²	day1.8.15 day1 day1-4	21日間	高度	FP最大6コース イメンド併用
FP	シスプラチン フルオロウラシル	CDDP: 100mg/m ² 5-FU: 1000mg/m ²	day1 day1-4	21日間	高度	イメンド併用
PCE 1コース目 PCE 2-6コース目 PCE 維持療法	セツキシマブ パクリタキセル カルボプラチン	C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² PTX: 100mg/m ² CBDCA: AUC2.5	day1.8.15 day1.8 day1.8	21日間	中等度	6コース目終了後 Cmab単剤で維持療法
PTX+Cmab 1回目 PTX+Cmab 2回目以降	セツキシマブ パクリタキセル	C-mab: (初回)400mg/m ² (2回目以降)250mg/m ² PTX: 80mg/m ²	day1	7日間		
ニボルマブ	ニボルマブ	NIVO: 3mg/kg	day1	14日間	-	
ペムブロリズマブ	ペムブロリズマブ	200mg	d1	21日間	-	
ペムブロリズマブ+CBDCA+5FU	ペムブロリズマブ カルボプラチン フルオロウラシル	ペムブロリズマブ: 200mg CBDCA: AUC5 5-FU: 1000mg/m ²	d1 d1 d1-4	21日間	-	
ペムブロリズマブ+CDDP+5FU	ペムブロリズマブ シスプラチン フルオロウラシル	ペムブロリズマブ: 200mg CDDP: 100mg/m ² 5-FU: 1000mg/m ²	d1 d1 d1-4	21日間	-	